



Optima Leaf-Cu+ yra vario pagrindu pagamintos skystos formos trąšos, kurios yra 100% komplekse su hepta-gliūkono rūgštimi (HGA).

Varis yra atsakingas už ląstelių stiprumą ir teigiamai veikia cukraus ir krakmolo gamybą augaluose.

OPTIMA LEAF+ -LINIJA

Optima Leaf-Cu+ yra vienas iš produktų, kuris priklauso Optima Leaf+ linijai. Ženklas „+“ parodo jog produkto sudėtyje yra papildomų mikroelementų. Šis būdas pagerina pagrindinio elemento įsisavinimą, ir apsaugo augalą nuo maistinių medžiagų trūkumo.

PRIVALUMAI

- Varis sudaro kompleksinį junginį su hepta-gliūkono rūgštimi.
- Užtikrina efektyvų vario pasisavinimą.
- Praturtintas papildomais mikro-elementais.
- Tinkamas naudoti ekologinėje žemdirbystėje EU 2018-848 & EU 2021-1165.

VARIO FUNKCIJOS

- Būtinai sėklos ir vaisiaus formavimosi etape.
- Būtinai chlorofilo formavimuisi ir fotosintezėi.
- Svarbus stiprioms, lanksčioms augalo ląstelėms.
- Teigiamai įtakoja krakmolo, cukraus gamybą ir vaisiaus skonį.

GALIMOS PRIEŽASTYS VARIO TRŪKUMUI

- Žemas vario lygis dirvoje.
- Dirvožemiai su aukštu humuso kiekiu gali sumažinti vario prieinamumą.
- Per daug azoto ir fosforo kiekiai dirvoje blokuoja vario prieinamumą augalams.
- Aukštas dirvožemio pH sumažina vario pasiekiamumą.



SUDĖTIS

Varis (Cu)*	56 g/L
Geležis (Fe)*	3,7 g/L
Manganas (Mn)*	1,7 g/L
Boras (B)*	0,37 g/L
Cinkas (Zn)*	0,31 g/L
Molibdenas (Mo)*	0,12 g/L
Tankis	1,25 kg/L
pH produkto išvaizda	7,5 – 8,5 Žalias tamsus skystis

* =vandenyje tirpus

ES TRĘŠIAMIESIEMS PRODUKTAMS

PAKUOTĖ

Gali būti pristatomas 17,5l pakuotėse arba IBC konteineriuose.

PRODUKTO PANAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Purškimas per lapus

(maksimali koncentracija 1:100, nebent nurodyta kitaip)

- **Grūdinės kultūros:**
1,5 litro hektarui.
2 - 5 kartus per sezoną, lapų vystymosi etape.
- **Medelynai, vynuogynai, maži vaismedžiai:**
1,5 litro hektarui.
4 - 6 kartus per sezoną, lapų vystymosi etape.
- **Pievos ir ganyklos:**
1,5 litro hektarui.
1 - 2 kartus per sezoną, lapų vystymosi etape.
- **Dekoratyviniai augalai:**
1,5 litro hektarui.
4 - 6 kartus per sezoną, lapų vystymosi etape.
- **Daržovės ir braškės:**
1,5 litro hektarui.
2 - 6 kartus per sezoną, lapų vystymosi etape.

Fertigacija

- **Visi augalai:**
Rekomenduojama norma visiems augalams:
2.0 litrai hektarui, kas dvi savaites, esant poreikiui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- **Prieš naudojimą gerai suplakite arba išmaišykite.**
- Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Šis gaminys buvo išbandytas ir gali būti saugiai laikomas nuo 5°C iki 25°C patalpose. Žemesnėje nei 5°C temperatūroje gali atsirasti nuosėdos.
- Nenaudokite produkto, jei temperatūra yra >25 °C arba ji gali pakilti iki >25 °C per kelias valandas po panaudojimo. Pageidautina purškimą atlikti dienos pabaigoje. Nenaudokite produkto arti derliaus nuėmimo.
- Produkto efektyvumas negali būti garantuotas, jei jis maišomas su kitais produktais. Prieš maišant rekomenduojama atlikti išankstinį testą.
- Nemaišyti su kitais produktais, kurie yra grynos formos ar netirpūs vandenyje. Produktas yra stabilus esant pH nuo 3,0 iki 12,0. Nemaišyti su produktais turinčiais fosforo.
- Mes rekomenduojame atlikti bandyminį purškimą mažame plote, prieš panaudojant visam laukui.
- Galiojimo laikas yra užtikrinimas, nurodytas ant pakuotės, jei yra laikomasi saugojimo reikalavimų, ir jei originali pakuotė yra nepažeista.

Ispėjimas: Šios rekomendacijos yra tik orientacinės. „Soiltech“ negali garantuoti jog produktas bus laikomas tinkamomis sąlygomis, ir ar bus panaudotas esant palankioms oro, dirvožemio sąlygom, dėl to „Soiltech“ jokiais būdais neprisiims atsakomybės dėl netinkamo sandėliavimo ar panaudojimo pažeidimų. Pirkėjas atsako už įsigytus produktus iš „Soiltech“ kompanijos. Rekomenduojama pasitarti su agronomu prieš panaudojant produktą. Jei kyla abejonių dėl produktų panaudojimo rekomenduojama kreiptis į konsultantą. Bendros taisyklės ir sąlygos yra skirtos visiems užsakymams. Šias taisykles galite rasti adresu www.soiltech.nl.